

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

TurboShield®

(TurboShield® Base + TurboShield® Activator)

*Doppia barriera attiva, a base di Bioxidium®,
per la detersione e la protezione dei capezzoli dopo la mungitura*

Caratteristiche:

TurboShield® si ottiene miscelando in parti uguali (50/50) TurboShield® Base e TurboShield® Activator .

La miscela TurboShield® (Base + Activator) unisce due forti azioni complementari:

- il potere igienizzante di Bioxidium®
- la barriera chimica e fisica (protezione attiva dei capezzoli tra due mungiture)

L'utilizzo di TurboShield® ha i seguenti vantaggi:

- il viraggio del colore indica quando la miscela igienizzante è attiva
- la protezione di lunga durata che isola fisicamente il capezzolo dall'ambiente esterno, fortemente contaminato
- la facilità di rimozione in quanto il colore è visibile sul capezzolo

Proprietà

Caratteristiche chimico-fisiche

TurboShield® Base

Aspetto	: liquido
Colore	: rosso
Sostanza principale	: acido lattico
Odore	: caratteristico
pH	: 2,75 ± 0,25
Temperature di stoccaggio	: 0°-30°C

TurboShield® Activator

Aspetto	: liquido
Colore	: incolore
Sostanza principale	: sodio clorito
Odore	: inodore
pH	: 8,5 ± 1,0
Temperatura di stoccaggio	: 0°-30°C

Applicazione Preparazione

Preparare la miscela (50% Base + 50% Activator) nel serbatoio di plastica dell'applicatore. **TurboShield®** si ottiene miscelando in parti uguali (50/50) **TurboShield® Base** (rosso) e **TurboShield® Activator** (incolore).

Prima della mungitura, preparare la miscela nel serbatoio di plastica dell'applicatore.

Chiudere l'applicatore avvitando la coppa sul serbatoio.

Agitare orizzontalmente l'applicatore per garantire una buona miscelazione.

Attendere almeno 2 minuti affinché la miscela sia attiva: il colore vira da rosso a giallo.

Far risalire la miscela con una leggera pressione sul serbatoio dell'applicatore, fino a riempire quasi completamente la coppa dell'applicatore.

Dopo la mungitura, immergere i capezzoli nella coppa dell'applicatore.

Evitare che gli animali si sdraino immediatamente dopo la mungitura.

La miscela è utilizzabile per due mungiture e deve essere rinnovata ogni 14 ore.

Lavare l'applicatore prima del rinnovo della miscela.

Protocollo di applicazione

Protocollo per le prime settimane di utilizzo di TurboShield®:

- allevatori che già utilizzano prodotti a base di diossido di cloro:
 - applicare TurboShield® dopo ogni mungitura, sostituendo completamente il prodotto precedentemente utilizzato
- allevatori che non utilizzano il post-mungitura o utilizzano prodotti non a base di diossido di cloro:
 - 1^a e 2^a settimana: dopo la mungitura alternare l'utilizzo di TurboShield® con il prodotto precedentemente utilizzato o con Velucid® D
 - dalla 3^a settimana: applicare TurboShield® dopo ogni mungitura

Sicurezza

Per rischi e frasi relative alla pericolosità, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Le indicazioni qui riportate sono state stabilite per condizioni d'impiego generale. Se Vi trovate in condizioni che si discostano dalla norma, per esempio in funzione della particolare durezza dell'acqua, o del metodo di lavoro o dei problemi di pulizia, Vi preghiamo di consultarci. Il nostro servizio tecnico Vi consiglierà e collaborerà con Voi.

23/08/2019